

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СИФИЛИСОМ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 1999-2007 ГГ.

Е.Г.Иванова, А.Б.Сотников, В.Л.Шейнкман
Тула, Россия

Цель исследования: провести анализ заболеваемости сифилисом по городам и районам Тульской области в период 1999-2007 гг.

Материалы и методы: исследование проводилось на базе ТОКВД в период с января 1999 г. по январь 2008 г. Анализировались данные с различных городов и районов ТО. Исследовались заболеваемость мужчин и женщин всех возрастов всеми формами сифилиса. Анализировалась заболеваемость сифилисом в зависимости от образования, от семейного положения, от возраста.

Результаты: рост заболеваемости сифилисом отмечен в гг. Туле, Донском, Новомосковске; в районах: Богородицком, Ефремовском, Киреевском, Ленинском, Новомосковском, Тепло-Огаревском, Узловском, Щекинском. В остальных районах и городах Тульской области отмечено снижение заболеваемости сифилисом.

Распределение заболеваемости сифилисом **по возрасту и полу** за период 1999-2008гг: **Мужчины:** в возрасте *от 0 до 14 лет* - наибольшее число заболевших было зарегистрировано в 1999 г. – 6 человек, наименьшее в 2007 г. – 0 чел. В возрасте *от 15 до 17 лет* наибольшее в 2004 г. - 5чел., наименьшее-в 2006 г. - 2чел. *От 18 до 19 лет*-наибольшее в 2007 г. - 14,наименьшее в 2001 г. – 4 чел. *От 20 до 29 лет*-наибольшее - в 2007 г. – 136 чел., наименьшее - в 2003 г. - 76 чел. *От 30 до 39 лет*-наибольшее в 2006 г. и 2007 г. – 79 чел., наименьшее - в 2003 г. – 42 чел. *От 40 лет и старше*-наибольшее в 2007г-79 чел., наименьшее в 2004 г. – 53 чел. **Женщины:** в возрасте *от 0 до 14 лет* – наибольшее в 2007 г. – 5 чел., наименьшее в 2002 г. – 0 чел. *От 15 до 17 лет*-наибольшее в 2007 г. – 13 чел., наименьшее в 2001 г. – 1 чел. *От 18 до 19 лет*-наибольшее в 2007 – 42 чел., наименьшее в 2004 г. – 8 чел. *От 20 до 29 лет* наибольшее в 2007 г. - 158, наименьшее в 2000 г. – 64 чел. *От 30 до 39 лет* - наибольшее в 2007 г. - 71, наименьшее в 2005 г. - 53чел. *От 40 лет и старше*-наибольшее в 2006 г. – 61 чел., наименьшее в 1999 г. – 26 чел.

Распределение заболеваемости сифилисом **по образованию** за период с 1999 по 2007 гг: **Мужчины:** *высшее обр.* - наибольшее в 2007 г. – 14 чел., наименьшее в 2002 г. - 4чел. *Средне-спец.* - наибольшее в 2007 г. – 76 чел., наименьшее - в 2003 г. - 26 чел. *Среднее* - наибольшее в 2004 г. – 176 чел., наименьшее в 2007 г. – 156 чел. **Женщины:** *высшее обр.* - наибольшее в 2007 г. – 16 чел., наименьшее в 2003 г. – 7 чел. *Средне-спец.* - наибольшее в 2007 г. - 63, наименьшее в 1999 г. – 28 чел. *Среднее*-наибольшее в 2007 г. – 201 чел., наименьшее в 2005 г. – 134 чел.

Заболеваемость сифилисом в зависимости **от семейного положения:** **мужчины:** *семейные* - наибольшее в 2001 г. – 96 чел., наименьшее в 2007 г. 75 чел., *холостые*-наибольшее в 2004 г. – 184 чел., наименьшее - в 2006 г. -126 чел. *Разведенные*-наибольшее в 2005 г. – 38 чел., наименьшее в 2007 г. - 25 чел. **Женщины:** *семейные* - наибольшее в 2007 г. - 69, наименьшее в 2004 г. – 23 чел. *Холостые* - наибольшее - в 2007 г. – 195 чел., наименьшее-в 2001 г. – 76 чел. *Разведенные*-наибольшее в 2007 г. - 39, наименьшее в 1999 г. – 16 чел.

Выводы: выявлена тенденция заболеваемости сифилисом: наибольшая заболеваемость сифилисом у холостых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 29 лет со средним образованием. Таким образом, заболеваемость сифилисом зависит от морально-нравственных устоев общества.